

Tájékoztató dTap védőoltás esedékességéről

(A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. és 15. §. alapján)

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Értesítem, hogynevű gyermeke,
születési helye és ideje:.....
tartózkodási címe:.....

dTap emlékeztető védőoltásra kötelezett.

Az oltás helye:

Az oltás időpontja:

Oltóorvos:

Kérem, szíveskedjék gyermeke **Oltási könyvét és a tájékoztatásról szóló igazoló szelvényt** az iskola-védőnőhöz eljuttatni!

Ha bármilyen okból a fenti időpontban a gyermeke nem tud megjelenni az oktatási intézményben, illetve ha a gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás alól végleges mentességet kapott, akkor ezt kérjük igazolni.

Tájékoztatom, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül, többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor a Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya elrendeli a védőoltásra kötelezett személy védőoltását.

Fontos, hogy még az oltás előtt tájékozott legyen! A védőoltással kapcsolatos fontosabb tudnivalók:

✂.....✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂

Aláírással igazolom, hogy az MMR védőoltásról szóló tájékoztatást, valamint az oltóhelyen való megjelenésről szóló értesítést megkaptam és átvettem:

Dátum: 201.....

.....
Szülő aláírása

A védőoltás három súlyos betegség, a **torokgyík** (Diftéria d), a **merevgörcs** (Tetanusz T) és a **szamárköhögés** (Pertussis ap) ellen a szervezetet emlékezteti – az alapimmunizálás keretében csecsemő és kisgyermekkorban kapott oltások révén – az ellenanyag termelésre. A megbetegedések megelőzése céljából Magyarországon, az általános iskolák 6. osztályát végző gyermek, illetve az adott évi Védőoltási Módszertani Levélben meghatározott korcsoportú gyermekek dTap emlékeztető védőoltásra kötelezettek.

A **torokgyík**, baktérium okozta fertőző betegség. Lassú kezdet, láz jellemzi, torok - diftériában a mandulákon szürkés-fehér álhártya, mely a garatívekre és a hátsó garatfalra is áterjedhet., a nyaki nyirokcsomók duzzadtak, súlyos esetben nyaki ödéma, gége-diftériában rekedt hang, ugató köhögés, nehéz légzés jelentkezik. A diftéria toxikus szövődményei: szívbelhártya gyulladás, perifériás idegbénulások.

A **merevgörcs** súlyos, magas halálozással járó betegség, bakteriális fertőzés. A kórokozó földdel szennyezett seben keresztül jut be a szervezetbe és ott toxint (mérget) termel. A toxin súlyos idegméreg, amelynek hatására az izmok görcsös állapotba kerülnek.

A **szamárköhögés** kínzó köhögéssel, húzó, hangos belégzéssel járó, több hétig tartó bakteriális fertőző betegség, mely a légúti váladékcseppekkel terjed. Fiatal csecsemőknél a köhögési roham végén légzésleállítás állhat be.

Az oltás helyén fellépő bőrpír, duzzanat beavatkozás nélkül megszűnik. Jelentkezhet láz, hányás, hasmenés, nyugtalanság. **A lázas állapot gondos megfigyelést és folyamatos lázcsillapítást igényel. A tünetek tartós fennállása esetén haladéktalanul jelentkezni kell az oltóorvosnál.**

Dátum:

PH.

Iskola-védőnő