

## Tájékoztató Hepatitis B védőoltás esedékességéről

(A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. és 15. §. alapján)

### Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Értesítem, hogy .....nevű gyermeke,  
születési helye és ideje:.....  
tartózkodási címe:.....

### Hepatitis B védőoltásra kötelezett.

Az oltás helye:

Az oltás időpontja:

Oltóorvos:

Kérem, szíveskedjék gyermeke **Oltási könyvét és a tájékoztatásról szóló igazoló szelvényt** az iskola-védőnőhöz eljuttatni!

Ha bármilyen okból a fenti időpontban a gyermeke nem tud megjelenni az oktatási intézményben, illetve ha a gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás alól végleges mentességet kapott, akkor ezt kérjük igazolni.

Tájékoztatom, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül, többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor a Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya elrendeli a védőoltásra kötelezett személy védőoltását.

Fontos, hogy még az oltás előtt tájékozott legyen! A védőoltással kapcsolatos fontosabb tudnivalók:

✂.....✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂  
Aláírással igazolom, hogy a Hepatitis B védőoltásról szóló tájékoztatást,  
valamint az oltóhelyen való megjelenésről szóló értesítést megkaptam és átvettem:  
Dátum:.....

.....  
Szülő aláírása

A vírusfertőzések közül – a Hepatitis B (vírusos májgyulladás) – okozta megbetegedések megelőzése céljából Magyarországon, az általános iskolák 7. osztályát végző tanulók, illetve az adott évi Védőoltási Módszertani Levélben meghatározott korcsoportú gyermekek Hepatitis B elleni védőoltásra kötelezettek. A védettség kialakításához 2 oltásra van szükség. A második oltás az első oltást követő 6 hónap múlva esedékes.

Hepatitis B vírus (HBV) vérrel, szövetnedvekkel, váladékokkal (ondó, hüvelyváladék, nyál) terjed. A hepatitis B fertőzés történhet:

- minimális mennyiségű vérrzel járó véletlenszerű karcolás eredményeként,
- rosszul sterilizált fecskendő vagy injekciós tű közvetítésével,
- kábítószeresek körében fertőződhet a közös fecskendő
- tetoválás
- fülcimpa vagy orr lyukasztása
- akupunktúra
- testnedvekben is kimutatták (nyálban, menstruációs és hüvelyváladékban, ondóban), melyek a korokozó átvivő-eszközöként szolgáltak
- vírushordozó kismama fertőzheti születendő gyermekét.

*Lappangási idő:* 45–180 nap, leggyakrabban 60–90 nap.

*Fontosabb tünetek:* Lassan kezdődik, rendszerint láz nélkül. A betegnél fáradtság, ízületi fájdalmak, étvágytalanság jelentkezik, majd ezt követően a sárgaság. A fertőzés krónikussá válhat. A krónikus fertőzés kialakulásának kockázata annál nagyobb, minél korábbi életkorban következik be a fertőződés. Késői következménye a májcirrhosis és a májrák.

Az oltás helyén fellépő bőrpír duzzanat beavatkozás nélkül megszűnik. Jelentkezhet láz, hányás, hasmenés, nyugtalanság. **A lázas állapot gondos megfigyelést és folyamatos lázcsillapítást igényel. A tünetek tartós fennállása esetén haladéktalanul jelentkezzen az oltóorvosnál!**

Dátum:

PH.

Iskola-védőnő