

Tájékoztató MMR védőoltás esedékességéről

(A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. és 15. §. alapján)

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Értesítem, hogynevű gyermeke,
születési helye és ideje:.....
tartózkodási címe:.....

MMR emlékeztető védőoltásra kötelezett.

Az oltás helye:

Az oltás időpontja:

Oltóorvos:

Kérem, szíveskedjék gyermeke **Oltási könyvét és a tájékoztatásról szóló igazoló szelvényt** az iskola-védőnőhöz eljuttatni!

Ha bármilyen okból a fenti időpontban a gyermeke nem tud megjelenni az oktatási intézményben, illetve ha a gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás alól végleges mentességet kapott, akkor ezt kérjük igazolni.

Tájékoztatom, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül, többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor a Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya elrendeli a védőoltásra kötelezett személy védőoltását.

Fontos, hogy még az oltás előtt tájékozott legyen! A védőoltással kapcsolatos fontosabb tudnivalók:

✂.....✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂

Aláírással igazolom, hogy az MMR védőoltásról szóló tájékoztatást, valamint az oltóhelyen való megjelenésről szóló értesítést megkaptam és átvettem:

Dátum: 201.....

.....
Szülő aláírása

A vírusok okozta, cseppfertőzéssel terjedő fertőző gyermekbetegségek közül - a **kanyaró, a mumpsz, a rózsahimlő** – megbetegedések megelőzése céljából Magyarországon, az általános iskolák 6. osztályát végző gyermek, illetve az adott évi Védőoltási Módszertani Levélben meghatározott korcsoportú gyermekek MMR emlékeztető védőoltásra kötelezettek.

A **kanyaró** (morbilli, **M**) 9-10 napos lappangási idő után lázzal, köhögéssel, huruttal és kötőhártya-gyulladással kezdődik, majd pár nap múlva a fül mögött kezdődő és az egész testen végigvonuló kiütések lépnek fel. Súlyos betegség, mely könnyen átvihető egyik emberről a másikra, szövődmények középfülgyulladás, tüdőgyulladás, ritkán agyvelőgyulladás lehetnek.

A **járványos fültőmirigy gyulladás** (mumpsz, **M**) 2-3 hét lappangási idő után lázzal és az egyik, majd a másik oldali nyálmirigy duzzanatával jár. Szövődmenyként a fűknél kialakuló heregyulladás súlyos következményekkel járhat.

A **rózsahimlő** (rubeola, **R**) lappangási ideje 2-3 hét. Gyermekeknél enyhe formában zajlik, láz apró kiütések, tarkótáji nyirokcsomó duzzanat formájában. A terhesség első harmadában átvészelt fertőzés következménye lehet az ún. **veszűletett rubeola** (fejlődési rendellenességekben jelentkezik).

Az oltóanyag, élő gyengített kanyaró, rózsahimlő és mumpsz vírusokat tartalmaz. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat a védekező-rendszerre. Általában az 5-12. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél észleltek és 1-2 napnál nem tartanak tovább. **A lázas állapot gondos megfigyelést és folyamatos lázcsillapítást igényel.**

A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa a gyermeke oltását végző orvost!

Dátum:

PH.

Iskola-védőnő